



		Obdobje gojenja v tednih	Svetloba/dan v urah	Terra Vega ml/10 l	Terra Flores ml/10 l	RHIZOTONIC ml/10 l	CANNAZYM ml/10 l	CANNABOOST ml/10 l	PK 13/14 ml/10 l	EC + v mS/cm	Skupno EC+ v mS/cm
<b>VEGETATIVNA FAZA</b>											
RAST	<b>Začetek / ukoreninjenje</b> - (3 - 5 dni) Zmočite substrat	<1	18	15-35	-	40	-	-	-	0.4-0.8	0.8-1.2
	<b>Vegetativna faza I</b> - Razvija se prostornina rasti	0-3 <sup>1</sup>	18	30-50	-	20	25	-	-	0.7-1.1	1.1-1.5
	<b>Vegetativna faza II</b> - Do stagnacije rasti po nastanku plodov ali začetku nastajanja cvetov	2-4 <sup>2</sup>	12	35-55	-	20	25	20 <sup>5</sup>	-	0.9-1.3	1.3-1.7
<b>GENERATIVNA FAZA</b>											
CVETENJE	<b>Generativna faza I</b> - Cvetovi ali plodovi se razvijajo v dolžini. Rastline dosežejo svojo višino	2-3	12	-	50-70	5	25	20-40	-	1.2-1.6	1.6-2.0
	<b>Generativna faza II</b> - Razvoj obsega (širine) cvetov ali plodu	1	12	-	50-70	5	25	20-40	15	1.5-1.9	1.9-2.3
	<b>Generativna faza III</b> - Razvoj mase (teže) cvetov ali plodov	2-3	12	-	40-60	5	25	20-40	-	1.0-1.4	1.4-1.8
	<b>Generativna faza IV</b> - Proces zorenja cvetov ali plodov	1-2	10-12 <sup>3</sup>	-	-	-	25-50 <sup>4</sup>	20-40	-	0.0	0.4

- To obdobje se razlikuje glede na vrsto in število rastlin na m<sup>2</sup>. Izvirne rastline v tej fazi ostanejo do konca (6 - 12 mesecev).
- Prehod z 18 na 12 ur je odvisen od sorte. Pravilo palca je menjava po 2 tednih.
- Če je zorenje prehitro, zmanjšajte čas osvetljenosti. Pazite na povečanje relativne vlažnosti.
- Podvojite odmerek CANNAZYM na 50 ml / 10 litrov v primeru ponovne uporabe substrata.
- Standardno razmerje je 20 ml / 10 litrov. Povečajte razmerje na največ 40 ml / 10 litrov za dodatno moč cvetenja.

EC: Električna prevodnost: Vrednost EC+ temelji na mS / cm, pri čemer je električna prevodnost vode = 0,0 pri 25 °C, pH 6,0.  
Uporabljeni vodi iz vodovoda dodajte EC, da dosežete priporočeno električno prevodnost!  
Skupna vrednost električne prevodnosti je v primeru z vodo iz vodovoda je 0,4.  
pH: Priporočeni pH je 5,8 - 6,2.  
Dodajanje pH- Lahko poveča električno prevodnost.  
Uporabite pH- Grow v vegetativni fazi, da zmanjšate vrednost pH.  
Uporabite pH- Bloom v generativni fazi, da zmanjšate vrednost pH.

Smernice v preglednici niso železno pravilo, ampak lahko gojiteljem začetkom pomagajo pri načrtovanju napredne strategije gojenja. Optimalno strategijo gnojenja nadalje določajo dejavniki, kot so: temperatura, vlažnost, vrste rastlin, prostornina korenin, odstotek vlage v substratu, strategija odmerjanja vode itd.

Sestavite si osebni urnik rasti in dodajanja hranil na [www.canna.si](http://www.canna.si).

**CANNA**  
The solution for growth and bloom