



SPLETNI
VODNIK ZA
GOJENJE

DNEVI IN TEDNI SVETLOBNE URE	VEGETATIVNA FAZA				GENERATIVNA FAZA							
	UKOREN- INJENJE	I	II		I			II	III	IV		
	D1-5	D6-25	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
	18	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Odmerki v ml na 10 l												
CANNA HYDRO VEGA A (SW)	24 - 31	28 - 35	28 - 35	28 - 35								
CANNA HYDRO VEGA B (SW)	24 - 31	28 - 35	28 - 35	28 - 35								
CANNA HYDRO FLORES A (SW)					28 - 35	28 - 35	28 - 35	28 - 35	28 - 35	24 - 32	21 - 28	
CANNA HYDRO FLORES B (SW)					28 - 35	28 - 35	28 - 35	28 - 35	28 - 35	24 - 32	21 - 28	
CANNA RHIZOTONIC	40	20	20	20	5	5	5	5	5			
CANNAZYM		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25 - 50 *	25 - 50
CANNABOOST			20 **	20	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40
CANNA PK 13/14								15				
CANNA CALMAG AGENT***	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4
CANNA FLUSH									40			40
mS/cm												
EC VODA***	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
EC HRANILA	1,4 - 1,8	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	2,0 - 2,5	1,4 - 1,8	1,2 - 1,6		
EC SKUPAJ	1,6 - 2,0	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	2,2 - 2,7	1,6 - 2,0	1,4 - 1,8		0,2

Ta načrt gojenja je namenjen rastlinam, ki razvijejo cvetove ali plodove, začeniši z enotedenskim potaknjenim ali sadiko. Trajanje vsake faze se lahko razlikuje glede na vrsto.

* Podvojite odmerek CANNAZYM na 50 ml/10 l, če ponovno uporabite substrat.

** Povečajte odmerek CANNABOOST na največ 40 ml/10 l med cvetenjem za dodatno moč.

*** Odmerjanje CANNA CALMAG AGENT je odvisno od EC vode, ki naj bi bila idealno 0,2-0,4 mS/cm. Če ima izhodiščna voda EC 0,0, se Calmag lahko uporabi v največji možni meri, da se doseže EC 0,4 mS/cm. Če je začetna voda že višja od 0,0, je treba uporabiti manjšo dozo Calmaga. Ta primer predvideva EC vode, ki je (prilagojena s Calmagom) 0,2 mS/cm.

Za daljšo rastno fazo ponovite priporočene odmerke iz vegetativne faze I (D6-25). Za daljšo cvetno fazo ponovite priporočene odmerke iz generativna faze I (W3-W5).

Dodajte CANNA PK 13/14 v obdobju 3-4 tedne pred žetjivo. Priporočena vrednost pH je med 5,2 in 6,2.

